




ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានស្តីពីការបង្ការជំងឺឆ្លង របស់សិស្សក្នុងសាលាមធ្យម



លេខ26-03(ត្រីមាសទី3 ឆ្នាំ2026)

រួមគ្នាការពារជំងឺឆ្លងថ្មីៗ, ក្នុងរដូវបើកបរសន្តិសុខសិស្ស

តើជំងឺគ្រុនផ្តាសាយកើតឡើងញឹកញាប់បំផុតនៅពេលណា?



ករណីជំងឺផ្តាសាយកើតឡើងជាចម្បងក្នុង រដូវវស្សាដ៏ផ្លាស់ប្តូរ ដោយផ្តោតលើកុមារអាយុចូល
រៀន(7~18ឆ្នាំ)។ មុនពេលចាប់ផ្តើមមានជំងឺ រាតត្បាត(ខែ10~11)



ប្រភព៖ ទិន្នន័យគ្រប់គ្រង និងបង្ការ ជំងឺកូរ៉ូណា, កែសម្រួលចេញពី ព្រឹត្តិបត្រតាមដានជំងឺឆ្លងប្រចាំសប្តាហ៍ ទី34(2026.8.27)

ដោយចាប់ផ្តើមឆ្នាំនេះ ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្តាសាយ, ត្រូវបានពង្រីកដល់អាយុ14ឆ្នាំ!

ចាក់វ៉ាក់សាំងឥតគិតថ្លៃ រហូតដល់ ឆ្នាំទី2 នៃអនុវិទ្យាល័យ
(កើតរវាង 2012.1.1~2026.8.31.)



តើកូនខ្ញុំ ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង នៅពេលណា?



អ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង	រយៈពេលចាក់វ៉ាក់សាំង
អ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង 2ដង	ថ្ងៃទី21 ខែ9 ឆ្នាំ2026 (ច័ន្ទ)~ថ្ងៃទី30 ខែ 4 ឆ្នាំ2027
អ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង 1ដង	ថ្ងៃទី21 ខែ9 ឆ្នាំ2026 (ច័ន្ទ)~ថ្ងៃទី30 ខែ4 ឆ្នាំ2027

* កុមារអាយុក្រោម 9ឆ្នាំ ដែលគ្មានប្រវត្តិចាក់វ៉ាក់សាំង ឬទទួលវ៉ាក់សាំងបានតែ1ដង
ត្រូវទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន2ដង

កន្លែងដែលត្រូវ ចាក់វ៉ាក់សាំង?



ស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រ និងមជ្ឈមណ្ឌល
សុខភាពសាធារណៈ
ដែលនៅជិតបំផុត

គេហទំព័រប្រព័ន្ធព័ត៌មានចាក់វ៉ាក់សាំង
(<https://nip.kdca.go.kr>)



ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានបង្ការជំងឺឆ្លងរបស់សិស្ស ការស្វែងមតិពេញចិត្ត និងគំនិតមតិយោបល់
រួចរាល់ក្នុងរយៈពេល1នាទី! សូមផ្តល់មតិយោបល់លើព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ដែលមាន5សំណួរ ហើយទទួលបានព័ត៌មាន មានប្រយោជន៍បន្ថែមទៀត
ស្កេនលេខQRកូដ ឥឡូវនេះ ដើម្បីចូលរួម!





តើអ្នកណាខ្លះដែលកើតជំងឺក្អកមាន, ច្រើនជាងគេ?



អ្នកជំងឺក្អកមានច្រើនជាង៨នាក់ ក្នុងចំណោម១០នាក់គឺ ជាក្មេងអាយុចូលរៀន!

ថ្មីៗនេះ មិនដូចកាលពីអតីតកាលទេ, ជំងឺក្អកមានកំពុងរីករាលដាលជាចម្បង ក្នុងចំណោមក្មេងជំទង់ ដែលមានអាយុចូលរៀន(អាយុ៧~១៨ឆ្នាំ)។

ក្មេងជំទង់អាយុចូលរៀន(អាយុ៧~១៨ឆ្នាំ)
84.6%(44,534នាក់)



ប្រភព៖ ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺកូរ៉េ.(២០២៥). និន្នាការនិងលក្ខណៈរោគរាតត្បាតនៃការកើតឡើងនៃជំងឺក្អកមាននៅកូរ៉េ (ពាក់កណ្តាលទីមួយ នៃឆ្នាំ២០២៤-២០២៥). សុខភាព និងជំងឺប្រចាំសប្តាហ៍, 18(43), 1631-1651. កែសម្រួលឡើងវិញដោយផ្អែកលើប្រភពនេះ។

ខ្ញុំក្អកជាប់រហូតបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺក្អកមាន តើខ្ញុំអាចទៅសាលារៀនបានទេ?

អ្នកអាចត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញបាន ចាប់តាំងពីការផ្តល់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកសមស្រប បានរយៈពេល ៥ថ្ងៃបានកន្លងផុត (ការសម្រេចចិត្តថាតើ ត្រូវចូលរៀនឬអត់ នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលក្រោយ តាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រ)

ផ្លូវរាតត្បាត

ដំណាក់ទឹក, សារធាតុរាវផ្លូវដង្ហើម

រោគសញ្ញាសំខាន់ៗ

1. ដំណាក់កាលដំបូង៖ ស្រដៀងនឹងជំងឺផ្តាសាយ (រោគសញ្ញាចលងខ្លាំង)



2. ដំណាក់កាលធ្វើទុក្ខ ក្អកខ្លាំងម្តងហើយម្តងទៀត



3. ដំណាក់កាលជាសះស្បើយ៖ ការក្អកនៅតែបន្តរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍



ការចាក់វ៉ាក់សាំង

វ៉ាក់សាំងបន្ថែម Tdap ត្រូវបានណែនាំសម្រាប់កុមារអាយុ១១~១២ឆ្នាំ

ច្បាប់ណែនាំសំខាន់ៗចំនួន៥ សម្រាប់បង្ការជំងឺឆ្លងផ្លូវដង្ហើម



1 អនុវត្តស៊ីដីវេជ្ជក្អក



2 ការធ្វើឱ្យការលាងដៃត្រឹមត្រូវ ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃ



3 កុំប៉ះភ្នែក, ប្រមុះ, និងមាត់ ដោយដៃ ដែលមិនទាន់លាង



4 អោយមានខ្យល់ចេញចូលក្នុងបន្ទប់ ឱ្យបានញឹកញាប់



5 សូមទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលសមស្រប បើសិនមានគ្រុនក្តៅ និងរោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើម