



庆尚南道

学生传染病预防健康通讯



第26-02号(2026年第2季度)

HPV预防接种，现在男性青少年也要一起参与！

人乳头瘤病毒(HPV)不仅会引发宫颈癌，还会导致生殖器疣(尖锐湿疣)、肛门癌、口咽癌等。

男女共同接种时，HPV的预防效果会更大。

接种对象

- 原有对象 - 12~17岁女性青少年
- 18~26岁低收入户女性



- 新增对象 12岁男性青少年(2014年出生)
自2026年5月6日起实施免费接种

接种指南


- 接种次数 12~14岁接种2次, 15~26岁接种3次。
- 接种机构 附近的指定医疗机构或保健所。



预防接种助手网站
(<https://nip.kdca.go.kr>)

查询指定医
疗机构

户外活动时，请小心日本脑炎蚊虫！



晋州市发现
1只小红家蚊
(三带喙库蚊)



全国发布预警

济州(26.3.20.)

庆南首次确认发现

晋州(26.4.27.)

*资料来源:庆尚南道保健环境研究院新闻资料。(2026.5.4.)

什么是日本脑炎?

被感染日本脑炎病毒的蚊子叮咬而引发的传染病。



症状

大多数为无症状或仅出现轻微不适，但少数可能会发展为脑炎，因此预防工作非常重要。



无症状



发烧、头痛



发展为脑炎

高烧
抽搐
麻痹

避免蚊虫叮咬的预防守则



户外活动时穿着
浅色长袖长裤。



避免使用浓烈香
水和化妆品。



清除居家环境周
围的积水。



使用驱蚊剂。



检查纱窗并使用
蚊帐。




避免夜间户外活动
(日落后~日出前)。

日本脑炎疫苗接种时间表

疫苗种类	接种次数	出生后 12-23个月	出生后 24-35个月	6岁	12岁
灭活疫苗	共 5剂	第1~2剂 基础	追加 第1次	追加 第2次	追加 第3次
减毒活疫苗	共 2剂	第1剂 基础	第2剂 基础	-	-

*减毒活疫苗与灭活疫苗之间不可交叉接种。

沙门氏菌感染症, 夏季更要格外小心!



沙门氏菌感染发病率趋势(2021年-2026年)

资料来源: 韩国疾病管理厅。(2026)。2026年第18周传染病抽样监测周报。

主要症状



发烧、头痛



呕吐



腹痛、腹泻

沙门氏菌感染症

这是一种由沙门氏菌(Salmonella)引起的细菌性肠道传染病。



潜伏期


6~72小时(最长可达10天)。



传播途径

- 受污染的水·食物。
- 主要是因食用生鸡蛋、未熟透的蛋类、肉类及相关加工食品而感染。
- 接触到感染沙门氏菌的动物及其周边环境。

水源.食物媒介的传染病预防守则



用流动的水和肥皂搓揉洗手30秒以上。



食物一定充分加热后再食用。



水一定煮沸后再饮用。




蔬菜和水果要用清水洗干净,或削皮后再食用。



出现腹泻症状时,请勿烹饪或准备食物。



保持烹饪卫生。



切鱼、切肉、切菜的砧板要分开使用。



一旦出现腹泻或呕吐等症状,请立即前往就医。