



慶尚南道 学生感染症だより



第26-02号 (2026年第2四半期)

HPV予防接種、これからは男子青少年の皆さんも対象です

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、子宮頸がんだけでなく、性器いぼ、肛門がん、中咽頭がんなどを引き起こす可能性があり、男女ともに接種することでHPVの予防効果はさらに高まります。

支援対象

- 従来 - 12~17歳の女子青少年
- 18~26歳の低所得層の女性



- 追加 12歳の男子青少年(2014年生まれ)
2026年5月6日~ 無料接種開始


接種案内

- 接種回数 12~14歳は2回、15~26歳は3回
- 接種機関 お近くの委託医療機関および保健所



予防接種情報サイト
(<https://nip.kdca.go.kr>) 「委託医療機関を探す」から検索可能

野外活動時は日本脳炎媒介蚊に注意



晋州(チンジュ)市にて
コガタアカイエカを
1個体確認



全国注意報発令

済州(2026年3月20日)

慶南地域で初確認

晋州(2026年4月27日)

*出典：慶尚南道保健環境研究院 報道資料(2026年5月4日)

日本脳炎とは？

日本脳炎ウイルスに感染した蚊に刺されることで発生する感染症



症状

ほとんどが無症状、または軽い症状ですが、まれに脳炎へ進行することがあるため、予防が重要



無症状



発熱・頭痛



脳炎進行

高熱
発作
麻痺

蚊に刺されないための予防ルール



1

野外活動時は明るい色の長袖・長ズボンを着用する



3

香りの強い香水や化粧品の使用を控える



5

家の周辺のたまり水を除去する



2

蚊よけ剤(虫よけスプレーなど)を使用する



4

網戸の点検・修理、および蚊帳(かや)を使用する



6


夜間の野外活動を控える(日没後~日の出前)

日本脳炎予防接種日程を確認しましょう

ワクチンの種類	接種回数	生後12~23ヶ月	生後24~35ヶ月	6歳	12歳
不活化ワクチン	計5回	1回目~2回目 初回	追加 1回目	追加 2回目	追加 3回目
生ワクチン	計2回	1回目 初回	1回目 初回	-	-

*生ワクチンと不活化ワクチンの交接種は認められていません。

サルモネラ菌感染症、夏場は特に注意しましょう



サルモネラ菌感染症の発生傾向 2021-2026

出典：疾病管理庁（2026）2026年第18週 感染症標本監視週間ニュースレター

主な症状



発熱・頭痛



嘔吐



腹痛・下痢

サルモネラ菌感染症とは？

サルモネラ菌（Salmonella）
によって発生する
細菌性感染症



潜伏期間


6～72時間（最大10日）



感染経路

- 汚染された水・食品
- 主に生卵、加熱不十分な卵・肉類および加工食品の摂取
- サルモネラ菌に感染した動物やその周辺環境との接触

水系・食品媒介感染症の予防ルール



流れる水と石けんで
30秒以上手洗い



食べ物は中心部まで
十分に加熱して食べる



水は沸かして飲む




野菜や果物は
きれいな水で洗うか、
皮をむいて食べる



下痢症状がある場合は
食品の調理・
準備をしない



衛生的に調理を行う



魚・肉・野菜のまな板を
分けて使用する



下痢や嘔吐症状が現れ
た場合は速やかに
医療機関を受診する