庆尚南道

学生传染病预防健康通讯



第26-01号(2026年第1季度)

新学期健康准备，从预防接种开始！

入学新生必备预防接种指南

由于孩子在婴幼儿时期接种的疫苗,免疫力会随时间减弱。为了开始团体生活的孩子们健康，请完成必备的预防接种。



DTaP(白喉、破伤风、百日咳)第5剂,
IPV(脊髓灰质炎)第4剂、
MMR(麻疹、流行性腮腺炎、风疹)第2剂,
日本脑炎第 4剂(灭活疫苗)或第2剂(减毒活疫苗)



Tdap(白喉、破伤风、百日咳)第6剂(或Td),
日本脑炎第 5剂（灭活疫苗）或第2剂(减毒活疫苗)、
HPV（人乳头瘤病毒）第1剂

预防接种助手网站
(https://nip.kdca.go.kr) ▶ 查询接种记录

关于流感（毒感）的常见问答

Q 去年（2025年10月）刚打过，今年（2026年3月）还要再打吗？

A 不需要。流感疫苗的预防接种是以“年度（9月至次年4月）”为单位的。如果去年秋天已经接种，效果会维持到今年春天，因此无需再次接种。（下次建议接种时期：2026年秋季）

Q 打了疫苗还是会得流感，为什么还要打？

A 接种后即使感染，症状也会轻很多，并能有效预防肺炎等重症并发症。



预防接种前后,请务必记得!

预防接种前

选择身体状态良好的日子前往。

未成年人原则上需由监护人陪同。若家长无法陪同, 请务必提前填写: ❶ 家长同意书*和 ❷ 预诊表**后再携带前往。

*下载同意书和预诊表方式: 预防接种助手网站 ▶ 预防接种管理 ▶ 相关资料下载。
**电子版预诊表可在预防接种助手网站上线上填写。

预防接种后

在医疗机构观察20~30分钟,确定无异常后再离开。

确认下次接种日期。(可申请提前通知服务)

若出现高烧、剧烈疼痛等异常反应时:


1 咨询医疗机构。
2 向保健所申报，或在预防接种助手网站的“预防接种后异常反应”栏目进行申报。

경상남도 GYEONGNAM
경상남도 감염병관리지원단 Gyeongnam Center for Infectious Disease Control and Prevention
경상남도교육청 GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION
경상남도가족센터 GYEONGSANGNAMDO FAMILY CENTER

水痘在开学后可能会感染数增加，请务必注意症状并遵守学校的出勤标准。

水痘是什么样的疾病？

传染性极强的病毒性疾病



感染途径



与水痘患者直接接触时




水痘患者咳嗽或打喷嚏时

潜伏期

通常10~21天
(平均14~16天)



主要症状与进展过程



微烧、疲劳感

皮疹从脸部或躯干开始，蔓延至四肢

小红斑
(稍微凸起的状态)

水疱
(水泡)

脓疱
(长脓的水泡)

结痂并恢复



传染期有多长？

- 出疹前1~2天起开始
- 所有水疱结痂为止



确诊水痘时的「隔离方法」(停课指南)

- 直到所有水疱结痂为止，应停止上学上课。(出疹后至少5天内)



- 仅出现斑疹、丘疹且未结痂时:
  建议隔离至24小时内不再出现新的皮肤病变为止。



家庭内管理

- 尽可能洗手间分开使用
- 餐具、毛巾分开使用



访问医院时


- 提前电话预约后访问
- 就诊时佩戴口罩
- 尽量减少与其他患者接触



接触者管理

- 建议在接触病毒后72小时内进行预防接种
- 进行21天的症状监测

守护我和朋友的水痘预防守则




确认预防接种史，未接种者应完成接种。



用肥皂在流动的水下洗手至少30秒。



咳嗽或打喷嚏时,用纸巾或衣袖遮住口鼻。



经常触摸的物品进行消毒。



监测疑似症状：出现发烧、皮疹时，应停止上学并前往就诊。

경상남도 GYEONGNAM
경상남도 감염병관리지원단 GNCDC Gyeongnam Center for Infectious Disease Control and Prevention
경상남도교육청 GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION
가족센터 경상남도가족센터 GYEONGSANGNAMDO FAMILY CENTER