




Информационный бюллетень по профилактике инфекционных заболеваний среди учащихся провинции Кёнсан-Намдо



Выпуск № 26-03 (3-й квартал 2026 года)

Вместе предотвратим респираторные инфекции в начале учебного года!

Когда грипп распространяется особенно активно?



Число заболевших гриппом обычно резко возрастает зимой и весной, особенно среди школьников 7-18 лет. Период до начала эпидемического сезона (октябрь-ноябрь)



Источник: Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний. Адаптировано на основе еженедельного бюллетеня по дозорному эпидемиологическому надзору за инфекционными заболеваниями, 34-я неделя (27 авг. 2026 г.)

С этого года бесплатная вакцинация против гриппа доступна детям до 14 лет включительно!

Бесплатная вакцинация для детей до 2-го класса
средней школы включительно
(родившихся с 1 января 2012 г. по 31 августа 2026 г.)



Когда привить ребёнка?



Категории лиц, подлежащих вакцинации	Период вакцинации
Дети, которым необходимы 2 дозы	21 сентября 2026 г. (пн.) — 30 апреля 2027 г.
Дети, которым необходима 1 доза	21 сентября 2026 г. (пн.) — 30 апреля 2027 г.

※ Некоторым детям младше 9 лет, которые ранее не прививались против гриппа или получили только одну дозу, необходимы две дозы вакцины.

Где можно сделать прививку?

В ближайшем медицинском учреждении, участвующем в программе вакцинации, или в центре общественного здравоохранения.



Сайт «Помощник по вакцинации»:
(<https://nip.kdca.go.kr>)



Анкета для оценки бюллетеня «Профилактика инфекционных заболеваний среди учащихся»
«Всего 1 минута! Ответьте на 5 вопросов, поделитесь своим мнением о бюллетене и помогите сделать его ещё полезнее». Отсканируйте QR-код и примите участие прямо сейчас!



Кто чаще всего болел коклюшем?



Более 8 из 10 заболевших коклюшем — дети и подростки школьного возраста!

В отличие от прошлых лет, коклюш распространяется преимущественно среди детей и подростков школьного возраста (7–18 лет).

Дети и подростки школьного возраста (7–18 лет)
84,6% (44 534 человека)

Учащиеся начальной школы (7–12 лет)



44.3%
(23,320 человек)

Учащиеся средней и старшей школы (13–18 лет)



40.3%
(21,214 человек)

Источник: Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний. (2025). «Тенденции заболеваемости коклюшем и эпидемиологические особенности в Республике Корея (2024 г. — первая половина 2025 г.)». Еженедельный журнал «Здоровье и болезни», 18(43), 1631–1651. Адаптировано на основе публикации.

Можно ли посещать школу, если после подтверждения коклюша кашель продолжается?

Посещение школы возможно по истечении 5 дней после начала соответствующей антибиотикотерапии.
(После этого вопрос о посещении школы решается по согласованию с медицинским учреждением.)

Пути передачи

Воздушно-капельный путь, респираторные выделения

Основные симптомы

1. Начальная стадия: симптомы, похожие на простуду (высокая заразность)



Насморк



Слезотечение



Лёгкий кашель

2. Стадия приступообразного кашля: повторяющиеся приступы сильного кашля



Приступообразный кашель



Рвота



Апноэ

3. Стадия выздоровления: кашель сохраняется в течение нескольких недель



Кашель постепенно уменьшается

Вакцинация

В 11–12 лет рекомендуется ревакцинация вакциной Tdap.

5 правил профилактики респираторных инфекций



1
Соблюдайте правила респираторного этикета



2
Регулярно и правильно мойте руки



3
Не трогайте глаза, нос и рот чужими руками



4
Чаше проветривайте помещения



5
При повышении температуры и появлении респираторных симптомов обратитесь в медицинское учреждение за необходимой медицинской помощью