



Информационный бюллетень по профилактике инфекционных заболеваний среди учеников провинции Кёнсан-Намдо



Выпуск №26-02 (2-й квартал 2026 года)

Вакцинация против ВПЧ: теперь и для мальчиков-подростков

Вирус папилломы человека (ВПЧ) может вызывать не только рак шейки матки, но и остроконечные кондиломы, рак анального канала, ротоглотки и другие заболевания. Эффективность профилактики ВПЧ значительно возрастает, если вакцинацию проходят как девушки, так и юноши.

Кому предоставляется бесплатная вакцинация?

- Ранее : - Девочки-подростки 12–17 лет
- Женщины 18–26 лет из малообеспеченных семей

- Дополнительно : мальчики 12 лет (рожденные в 2014 году).
Бесплатная вакцинация проводится с 6 мая 2026 года



Информация о вакцинации


- В возрасте : 12–14 лет — 2 дозы; в возрасте 15–26 лет — 3 дозы.
- Место вакцинации : ближайшее уполномоченное медицинское учреждение или центр общественного здравоохранения.



Проверить список медицинских учреждений можно на сайте помощника по вакцинации: (<https://nip.kdca.go.kr>)

Поиск медицинских организаций, участвующих в программе вакцинации.

Во время отдыха на природе остерегайтесь комаров — переносчиков японского энцефалита



В городе Чинджу выявлена 1 особь малого красного домового комара




После объявления общенационального предупреждения
Чеджу (20.03.2026)

Первое выявление в провинции Кёнсан-Намдо
Чинджу (27.04.2026)

Источник: пресс-релиз Научно-исследовательского института здравоохранения и окружающей среды провинции Кёнсан-Намдо (04.05.2026).

Что такое японский энцефалит?

Инфекционное заболевание, возникающее после укуса комара, зараженного вирусом японского энцефалита.



Симптомы

В большинстве случаев протекает бессимптомно или сопровождается легкими симптомами, однако в редких случаях может перейти в энцефалит, поэтому профилактика имеет важное значение.

Бессимптомное течение

Лихорадка и головная боль

Развитие энцефалита
высокая температура
судороги
паралич

Меры профилактики укусов комаров



Во время пребывания на улице носить светлую одежду с длинными рукавами.



Воздерживаться от использования парфюмерии и косметики с сильным запахом.



Удалять стоячую воду вокруг дома.



Использовать средства от комаров.



Следить за состоянием москитных сеток и использовать противомоскитные сетки.




Воздерживаться от пребывания на улице в ночное время (от заката до рассвета).

Проверьте график вакцинации против японского энцефалита

Тип вакцины	Количество прививок	12-23 месяца	24-35 месяцев	6 лет	12 лет
Инактивированная вакцина	Всего 5 доз	1-я и 2-я дозы (основной курс)	1-я ревакцинация	2-я ревакцинация	3-я ревакцинация
Живая вакцина	Всего 2 дозы	1-я доза (основной курс)	2-я доза (основной курс)	-	-

* Взаимозаменяемое применение живой и инактивированной вакцин не допускается.


Сальмонеллез: будьте особенно осторожны в летний период



Динамика заболеваемости сальмонеллезом (2021-2026 гг.)

Источник: Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (2026). Ежедневный информационный бюллетень по выборочному эпидемиологическому надзору за инфекционными заболеваниями, 18-я неделя 2026 г.

Основные симптомы



Повышенная температура, головная боль




Рвота



Боль в животе, диарея

Инфекция сальмонеллез

Бактериальная инфекция, вызываемая бактериями рода *Salmonella*.



Инкубационный период

6-72 часа (максимум до 10 дней).



Пути передачи

- Загрязненная вода и пища
- При употреблении сырых яиц, недостаточно термически обработанных яиц, мяса и продуктов их переработки
- Контакт с животными, зараженными сальмонеллой, а также с окружающей их средой.

Правила профилактики кишечных и пищевых инфекций



Мыть руки с мылом под проточной водой не менее 30 секунд.



Тщательно подвергать пищу термической обработке.



Пить только кипяченую воду.




Овощи и фрукты тщательно мыть чистой водой либо очищать от кожуры перед употреблением.



При наличии симптомов диареи не заниматься приготовлением и подготовкой пищи.



Соблюдать правила гигиены при приготовлении пищи.



Использовать отдельные разделочные доски для рыбы, мяса и овощей.



При появлении симптомов диареи или рвоты незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.